

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ПАЦИЕНТА

РЕКРЕОЛ®

крем для наружного применения 50 мг/г

Декспантенол

Перед применением этого лекарственного средства внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию.

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этом листке-вкладыше, или же так, как указал Вам врач или фармацевт.

- Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже потребуются его перечитать.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте фармацевта.
- Если у Вас возникли какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не упомянутым в этом листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после начала лечения, Вам следует проконсультироваться с врачом.

В этом листке-вкладыше можете узнать:

1. Что такое Рекреол и для чего его применяют
2. Что Вам следует знать перед применением Рекреол
3. Как применять Рекреол
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Рекреол
6. Содержание упаковки и другая информация

1. Что такое Рекреол и для чего его применяют

Крем Рекреол содержит активное вещество – декспантенол, которое принадлежит к группе лекарств для лечения ран и язв. В тканях декспантенол превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота восстанавливает эластичность кожи и стимулирует заживление ран.

Крем Рекреол применяют:

- для лечения поверхностных повреждений кожи различного происхождения. Он помогает увлажнять верхний слой кожи и способствует заживлению с последующим противовоспалительным и противозудным действием.

Крем Рекреол можно применять детям, подросткам и взрослым.

2. Что Вам следует знать перед применением Рекреол

Не применяйте крем Рекреол в следующих случаях:

- если у Вас аллергия к декспантенолу или какому-либо другому (упомянутому в разделе б.) компоненту этого лекарства;
- не применяйте крем на раны, если у Вас гемофилия, потому что имеется высокий риск кровотечения.

Предупреждения и меры предосторожности при применении

Применение крема Рекреол следует прекратить в случае возникновения признаков аллергической реакции.

Следует избегать попадания крема в глаза.

Другие лекарственные средства и Рекреол

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете в последнее время, применяли или могли бы применять.

Нет доказательств того, что крем Рекреол взаимодействует с другими лекарствами.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Крем Рекреол можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания в соответствии с рекомендациями врача.

Следует избегать нанесения крема на грудь, чтобы предотвратить попадание в рот ребенка.

Исследования влияния декспантенола на фертильность человека не проводились.

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов

Крем Рекреол не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

Крем Рекреол содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин и пропиленгликоль

Цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). Крем содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

3. Как применять Рекреол

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этом листке-вкладыше или как Вам указал врач или фармацевт. В случае неясности спрашивайте врача или фармацевта.

Для наружного применения.

Если не указано иначе, крем наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи взрослым и детям один или несколько раз в день по необходимости. Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.

Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после начала применения, Вам следует проконсультироваться с врачом.

Применение детям и подросткам

Декспантенол можно применять детям.

Если Вам кажется, что действие крема Рекреол слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Возможные побочные реакции

Подобно всем лекарствам, это лекарство может вызывать побочные реакции, хотя не у всех они проявляются.

Очень редко (могут появиться меньше чем у 1 из 10 000 человек):

- аллергические реакции и реакции повышенной чувствительности (например, воспаление кожи/аллергические реакции на коже и раздражение кожи).

Информирование о побочных действиях

Если у Вас появляются какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, которые не упомянуты в этом листке-вкладыше. Вы можете сообщать о побочных эффектах также непосредственно через национальную систему отчетности, сведения о которых опубликованы на веб-сайте Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям: www.amdm.gov.md или по электронной почте: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь в обеспечении наиболее широкой информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Рекреол

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять это лекарство по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарство в канализацию или в бытовые отходы. Спрашивайте фармацевта, как уничтожаются лекарства, которые больше не применяете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержание упаковки и другая информация

Что содержит крем Рекреол

- Активное вещество: декспантенол.
1 г крема содержит 50 мг декспантенола.
- Вспомогательные вещества: DL-пантолактон, феноксиэтанол, калия цетилфосфат, ланолин (овечий жир), пропиленгликоль, стеариловый спирт, цетиловый спирт, изопрропилмиристат, вода очищенная до 1 г.

Внешний вид крема Рекреол и содержание упаковки

Гомогенный белый или желтоватый крем со специфическим запахом.

По 30 г или 50 г препарата в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы.

1 туба в пачке картонной вместе с листком-вкладышем по применению.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Владелец регистрационного удостоверения

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Тел: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Эл. почта: grindeks@grindeks.lv

Производитель

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен в августе 2022.

Более подробная информация об этом продукте доступна на веб-сайте Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>