

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ПАЦИЕНТА

### РЕКРЕОЛ®

мазь для наружного применения 50 мг/г

Декспантенол

**Перед применением этого лекарственного средства внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию.**

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этом листке-вкладыше, или же так, как указал Вам врач или фармацевт.

- Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже потребуются его перечитать.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте фармацевта.
- Если у Вас возникли какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не упомянутым в этом листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после начала лечения, Вам следует проконсультироваться с врачом.

**В этом листке-вкладыше можете узнать:**

1. Что такое Рекреол и для чего его применяют
2. Что Вам следует знать перед применением Рекреол
3. Как применять Рекреол
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Рекреол
6. Содержание упаковки и другая информация

#### **1. Что такое Рекреол и для чего его применяют**

Мазь Рекреол содержит активное вещество – декспантенол, которое принадлежит к группе лекарств для лечения ран и язв. В тканях декспантенол превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота восстанавливает эластичность кожи и стимулирует заживление ран.

Мазь Рекреол применяют:

- для лечения поверхностных повреждений кожи различного происхождения. Она помогает увлажнять верхний слой кожи и способствует заживлению с последующим противовоспалительным и противозудным действием.

Мазь Рекреол можно применять детям, подросткам и взрослым.

#### **2. Что Вам следует знать перед применением Рекреол**

**Не применяйте мазь Рекреол в следующих случаях:**

- если у Вас аллергия к декспантенолу или какому-либо другому (упомянутому в разделе б.) компоненту этого лекарства;
- не применяйте мазь на раны, если у Вас гемофилия, потому что имеется высокий риск кровотечения.

### **Предупреждения и меры предосторожности при применении**

Применение мази Рекреол следует прекратить в случае возникновения признаков аллергической реакции.

Следует избегать попадания мази в глаза.

Если мазь Рекреол используется в аногенитальной области, это может повлиять на прочность презерватива.

#### *Особая осторожность при применении Рекреол*

Во время применения Рекреол не курите и не приближайтесь к открытому огню из-за риска тяжелых ожогов. Ткань (одежда, постельное белье, бинты и т. д.), контактировавшая с этим лекарством, легче воспламеняется и представляет собой серьезную опасность возгорания. Стирка одежды и постельного белья может уменьшить накопление лекарства в тканях, но не удалить его полностью.

### **Другие лекарственные средства и Рекреол**

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете в последнее время, применяли или могли бы применять.

Нет доказательств того, что мазь Рекреол взаимодействует с другими лекарствами.

### **Беременность, кормление грудью и фертильность**

Мазь Рекреол можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания в соответствии с рекомендациями врача.

Следует избегать нанесения мази на грудь, чтобы предотвратить попадание в рот ребенка.

Исследования влияния декспантенола на фертильность человека не проводились.

### **Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов**

Мазь Рекреол не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

### **Мазь Рекреол содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин**

Цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

## **3. Как применять Рекреол**

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этом листке-вкладыше или как Вам указал врач или фармацевт. В случае неясности спрашивайте врача или фармацевта.

Для наружного применения.

Если не указано иначе, мазь наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи взрослым и детям один или несколько раз в день по необходимости. Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.

Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после начала применения, Вам следует проконсультироваться с врачом.

## **Применение детям**

Декспантенол можно применять детям.

Если Вам кажется, что действие мази Рекреол слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

## **4. Возможные побочные реакции**

Подобно всем лекарствам, это лекарство может вызывать побочные реакции, хотя не у всех они проявляются.

*Очень редко* (могут появиться меньше чем у 1 из 10 000 человек):

- аллергические реакции и реакции повышенной чувствительности (например, воспаление кожи/аллергические реакции на коже и раздражение кожи).

## **Информирование о побочных реакциях**

Если у Вас появляются какие-либо побочные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, которые не упомянуты в этом листке-вкладыше. Вы можете сообщать о побочных эффектах также непосредственно через национальную систему отчетности, сведения о которых опубликованы на веб-сайте Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) или по электронной почте: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь в обеспечении наиболее широкой информации о безопасности этого лекарства.

## **5. Как хранить Рекреол**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять это лекарство по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарство в канализацию или в бытовые отходы. Спрашивайте фармацевта, как уничтожаются лекарства, которые больше не применяете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

## **6. Содержание упаковки и другая информация**

### **Что содержит мазь Рекреол**

- Активное вещество: декспантенол.  
1 г мази содержит 50 мг декспантенола.
- Вспомогательные вещества: стеариловый спирт, цетиловый спирт, воск пчелиный белый, протегин ХN (жидкий парафин, петролатум, озокерит, глицерил олеат, ланолиновый спирт), масло миндальное, парафин мягкий белый, парафин жидкий, ланолин (овечий жир), вода очищенная до 1 г.

**Внешний вид мази Рекреол и содержание упаковки**

Гомогенная желтоватая мазь со специфическим запахом.

По 30 г или 50 г препарата в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы.

1 туба в пачке картонной вместе с листком-вкладышем по применению.

**Владелец регистрационного удостоверения и производитель****Владелец регистрационного удостоверения**

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Тел: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Эл. почта: [grindeks@grindeks.lv](mailto:grindeks@grindeks.lv)

**Производитель**

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

**Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен в ноябре 2022.**

Более подробная информация об этом продукте доступна на веб-сайте Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>